

VARIEDADES DE BATATA-SEMENTE



Características, Aptidões e Resistências:

Variedade	Cor da Polpa	Ciclo (*)	Grupo Culinário (**)	Matéria Seca (%)	Aptidão para...				Resistências (****)								
					Produção Precoce (temporã)	Lavar (pele lisa)	Cultivo Estival (***)	Conservação	MF	MT	SC	SP	TRV	Yn	Yntn	Ro	Pa
Mercado de Fresco – pele Vermelha:																	
CAMEL	Amarela	Curto a Médio	AB	19	Sim	Sim	Sim	Sim, longa	I	H	I	I	H	H	H	H	H
DESIREE	Amarela clara	Tardio	B	21				Sim, longa		H			H		H		
DIROSSO	Amarela	Muito curto	AB	18	Sim	Sim	Sim	Sim		H	H	H	H		H	H	H
ROYATA	Amarela	Curto	B	19	Sim	Sim	Sim	Sim	H	H	H	H	H	I		H	H
ZINA RED	Amarela	Curto	AB	20	Sim		Sim	Sim	H	I	H	H	H		H	H	
Mercado de Fresco – pele Branca ou Amarela:																	
AMARIN	Branca	Curto	B	19	Sim	Sim	Sim	Sim	I	H	I	I	I	I	H	H	
AVANTI	Amarela	Muito curto	A	16	Sim	Sim	Sim	Sim		H	H	H	H		H	H	
BELLINI	Amarela clara	Curto a Médio	B	21	Sim		Sim	Sim	I	H	I		H		H	H	
BONNATA	Amarela clara	Curto	BC	21	Sim	Sim	Sim	Sim, longa	H	I	H	H		H			
EL MUNDO	Amarela clara	Curto a Médio	AB	18	Sim	Sim	Sim	Sim, longa	H	H	H	I	H		H	H	
EVEREST	Amarela clara	Muito curto	AB	19	Sim		Sim		I	H	I				H	H	
GAUDI	Amarela	Curto a Médio	AB	18	Sim	Sim	Sim	Sim, longa	I	H	H	I	H	I	H	H	
SAFARI	Amarela clara	Médio	B	20				Sim, longa	H	I			H		H	H	
TRIPLO	Amarela clara	Curto	B	21	Sim		Sim		H	H	I		I	I	I	H	
TYSON	Amarela clara	Curto a Médio	AB	21	Sim	Sim	Sim	Sim, longa	I	H	H	H	H		H	H	
VITALIA	Amarela clara	Curto	AB	18	Sim	Sim	Sim	Sim	I	H	H		H		H		
Fritura em Rodelas (chips) para indústria:																	
LEVINATA	Amarela	Curto	BC	23	Sim		Sim	Sim, longa	I	H	H	H	H	I	H	H	
SHC 1010	Amarela	Curto	BC	23	Sim		Sim	Sim, longa	I	H	H	H	H	I	H	H	
VR 808	Amarela	Curto	BC	23			Sim	Sim, longa		H	H	I	H		H	H	
Fritura em Palitos (tipo Agria) para HoReCa:																	
BRICATA	Amarela	Curto	BC	22	Sim	Sim (A)	Sim	Sim, longa	I	H	H	H	H		H	H	

(*) Ciclo da plantação à colheita, em que: Curto = Precoce ou Temporã; Tardio = Serôdio ou ciclo cultural longo. (**) Grupo Culinário – classificação das variedades de acordo com o grau de desintegração da polpa quando cozidas, a firmeza da polpa e por serem ou não farinhentas: A – Firme; B – Relativamente firme; C – Farinhenta; D – Muito farinhenta. (***) Cultivo Estival: refere-se ao cultivo de batata no Sul e Centro de Portugal, com plantação no período de Verão (meses de Julho e Agosto) e com colheita no período de Outubro a Março. (****) Resistências: MF – míldio nas folhas; MT – míldio nos tubérculos; SC – sarna comum; SP – sarna pulverulenta; TRV – vírus da necrose anelar da batata; Yn – vírus Yn; Yntn – vírus Yntn; Ro – nemátode de quisto *Globodera rostochiensis*; Pa – nemátode de quisto *Globodera pallida*. H – resistência alta; I – resistência intermédia. Dados resultantes da observação pela STET. A falta de indicação, significa que não tem resistência ou que está atualmente em avaliação.

(A) Em solos arenosos, com a aplicação de dessecante no início da fase de senescência e com a realização da colheita até 3 a 4 semanas depois.

Catálogo completo em português, com estas e outras variedades, disponível em: www.adv-agri.com/batata-de-semente/

Contactos em Portugal:

Eng. Sérgio Margaço | Tel. (00351) 913 894 820

Email: comercial@365agro.com | WWW.ADV-AGRI.COM

WWW.STET-POTATO.COM

potatoes are life.